



LOGRAN 20 WG je sistemski herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u žitaricama.

Sastav:	Triasulfuron (200 g/kg).
Formulacija:	Močive granule (WG).
Opis pripravka:	Sistemski herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u ozimoj pšenici i ječmu. Potrebno ga je primijeniti na korove u mladim razvojnim stadijima. Može se primijeniti već na jesen (zbog odličnog rezidualnog djelovanja) ili u proljeće, ovisno o dinamici pojave korova.
Način djelovanja:	Triasulfuron se usvaja i putem lista i putem korijena, dakle posjeduje i snažno rezidualno djelovanje na naknadni ponik korova. Kao i sve sulfoniluree sprečava rast korova ubrzo nakon primjene, dok potpuno odumiranje obično nastupa 14 -21 dan nakon primjene.
Primjena:	LOGRAN 20 WG se upotrebljava za suzbijanje širokolisnih korova, uključujući i one otporne na hormonalne herbicide: ljubica (<i>Viola arvensis</i>), čvorasti smrdelj (<i>Galeopsis tetrahit</i>), kamilica (<i>Matricaria</i> spp.), zrakasta smrdulja (<i>Bifora radians</i>) i dr. u ozimoj i jaroj pšenici, ozimom i jarom ječmu, zobi, raži i pšenoraži u količini od 35-40 g/ha (3,5-4,0 g/1000 m²). Tretiranje se provodi nakon nicanja kada usjev razvije 3 lista (stadij razvoja prema BBCH 13) pa do završetka busanja (stadij razvoja prema BBCH 30). LOGRAN 20 WG se primjenjuje prskalicama koje se uobičajeno koriste za primjenu herbicida uz utrošak vode od 100-400 l/ha.

Miješanje:	Za suzbijanje korova u žitaricama, miješa se s herbicidom FILON 80 EC (Filon 3 l/ha + Logran 37g/ha) O drugim mogućnostima miješanja sredstva LOGRAN 20 WG raspitajte se kod vlasnika rješenja o registraciji ili zastupnika. Lišće tretiranog celera ne smije se koristiti u ljudskoj prehrani.
Upozorenja:	<i>Plodored:</i> Prije sjetve u ljeto, jesen ili proljeće potrebno je preorati sve površine koje su bile tretirane sredstvom LOGRAN 20 WG. Sljedeće kulture 4-5 mjeseci nakon primjene LOGRANA 20 WG mogu biti: lucerna, žitarice, grah, djetelina, engleski ljulj, uljana repica, grašak i facelija. Sljedeće kulture 10-12 mjeseci nakon primjene herbicida LOGRAN 20 WG mogu biti: kukuruz, krumpir, soja, šećerna repa i suncokret. Nakon minimalno 24 mjeseca mogu slijediti ukrasno bilje i vrtno raslinje. Sredstvo se smije primijeniti samo jednom godišnje na istoj površini. Prilikom primjene treba spriječiti zanošenje škropiva na susjedne usjeve. Primjena sredstva iz zrakoplova nije dopuštena. Ne tretirati po vjetrovitom vremenu.
Karenca:	Osigurana je vremenom primjene u pšenici, ječmu, zobu, raži i pšenoraži za zrno; 14 dana za pšenicu, ječam, zob, raž i pšenoraž za silažu.
Podaci o registraciji:	Rješenje MPRRR RH: Klasa: UP/I-320-20/08-01/155.
Prilog:	Uputa za primjenu, sigurnosno-tehnički list.
Važno:	Prije primjene obavezno pročitajte upute za primjenu.
Pakiranje:	18,5 g, 2 x 18,5 g, 120 g i 250 g.

Sigurnosno - tehnički list

STL_Logran 20 WG

- [PDF](#) (477 KB)